051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page1

Avertissement

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Recueillir le produit répandu.
- Éliminer le contenue et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Waarschuwing

GEVARENAANDUIDINGEN

- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Voorkom lozing in het milieu.
- Gelekte/gemorste stof opruimen.
- Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Warnung

GEFAHRENHINWEISE

- Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- Darf nicht in die Umwelt gelangen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt und Behälter nach Sammlung für gefährlich Abfall zuführen.

Altacor®

INSECTICIDE

GROUPE / GROEP	28	INSECTICIDE

powered by RYNAXYPYR®

Insecticide pour le contrôle des insectes en culture de légumes-fruits, légumes feuilles, fines herbes et haricot vert sous protection.
Insecticide voor de bestrijding van insecten in vruchtgroenten, bladgroenten, verse kruiden en stamslabonen onder bescherming.

Numéro d'agréation / Erkenningsnummer: 10300P/B

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 35% chlorantraniliprole
Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 35% chloorantraniliprole.

Contenu / Inhoud: 500 g e

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.

Dans les situations urgentes vous pouvez toujours prendre contact avec le centre DUCHEM HELP: tel. **00.352/3666.6543** ou avec le Centre Anti-Poisons, tel. **070/245.245.**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
Voor het gebruik de gebruiksaanwijzing lezen.

In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum : tel. **00.31.78/630.1899** of met het Antigifcentrum: tel. **070/245.245.**

STOCKAGE
Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

OPSLAG
In originele goed gesloten verpakking bewaren.

PhytofarRecover
www.phytofarrecover.eu

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A.
Antoon Spinoystraat 6, 2800 Mechelen
Tel.: 0032 475/415.415

Fabriqué en France / Gefabriceerd in Frankrijk

® Marque déposée de / Gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

K-32699/31405 - BELGIUM

3 576960 057882

Numéro de lot /
Lotnummer:
Date de production /
Productiedatum:

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

Avertissement

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Recueillir le produit répandu.
- Éliminer le contenue et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Waarschuwing

GEVARENAANDUIDINGEN

- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Voorkom lozing in het milieu.
- Gelekte/gemorste stof opruimen.
- Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Warnung

GEFAHRENHINWEISE

- Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- Darf nicht in die Umwelt gelangen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt und Behälter nach Sammlung für gefährlich Abfall zuführen.

Altacor®

INSECTICIDE

GROUPE / GROEP	28	INSECTICIDE

powered by RYNAXYPYR®

Insecticide pour le contrôle des insectes en culture de légumes-fruits, légumes feuilles, fines herbes et haricot vert sous protection.
Insecticide voor de bestrijding van insecten in vruchtgroenten, bladgroenten, verse kruiden en stamslabonen onder bescherming.

Numéro d'agréation / Erkenningsnummer: 10300P/B

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 35% chlorantraniliprole
Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 35% chloorantraniliprole.

Contenu / Inhoud: 500 g ℮

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement.

Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.

Dans les situations urgentes vous pouvez toujours prendre contact avec le centre DUCHEM HELP: tel. **00.352/3666.6543** ou avec le Centre Anti-Poisons, tel. **070/245.245.**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

Voor het gebruik de gebruiksaanwijzing lezen.

In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum : tel. **00.31.78/630.1899** of met het Antigifcentrum: tel. **070/245.245.**

STOCKAGE
Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

OPSLAG
In originele goed gesloten verpakking bewaren.

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A.
Antoon Spinoystraat 6, 2800 Mechelen
Tel.: 0032 475/415.415

PhytofarRecover
www.phytofarrecover.eu

Fabriqué en France / Gefabriceerd in Frankrijk

® Marque déposée de /
Gedeponeerd handelsmerk van
E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

3 576960 057882

K-32699/31405 - BELGIUM

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page3

DUPONT

Altacor®

INSECTICIDE

GROUPE	28	INSECTICIDE

powered by RYNAXYPYR®

Insecticide pour le contrôle des insectes en culture de légumes-fruits, légumes feuilles, fines herbes et haricot vert sous protection.

Numéro d'agréation : 10300P/B

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 35% chlorantraniliprole

® Marque déposée de
E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

Avertissement

MENTIONS D'AVERTISSEMENT
• Très toxique pour les organismes aquatiques entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE
• Tenir hors de portée des enfants.
• Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
• Éviter le rejet dans l'environnement.
• Recueillir le produit répandu.
• Éliminer le contenue et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

AUTRES MENTIONS
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
• Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
• Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

STOCKAGE
• Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

DESTRUCTION EMBALLAGE VIDE
Vider complètement l'emballage et rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation et utilisées suivant les prescriptions d'emploi.
L'emballage ainsi rincé ne peut être utilisé à d'autres fins mais doit être traité conformément aux dispositions légales régionales (PhytofarRecover).

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page4

UTILISATION AUTORISEE

Prescription d'emploi

Est uniquement autorisé pour l'emploi en tant que insecticide dans les cultures sous protection de :

a. tomate;
b. poivron/piment;
c. aubergine et pépinos;
d. concombre;
e. cornichon;
f. courgette/patisson ;
g. melon;
h. potiron;
i. haricot vert;
j. mâche;
k. laitues;
l. endives, radicchio rosso, Pain de sucre;
m. roquette;
n. jeunes pousses (recoltées jusqu`au stade 8 vraies feuilles);
o. épinard;
p. bette;
q. fine herbes (consommation des feuilles et/ou tiges).

Délai ultime d'utilisation avant la récolte

1 jour.

MODE D'EMPLOI

GÉNÉRALITÉS

Mode d'action

ALTACOR® est un insecticide qui doit être utilisé pour lutter contre des chenilles défoliatrices et/ou les mineuses de la tomate (*Tuta absoluta*). ALTACOR® à principalement une action larvaire. Toutes les stades larvaires sont détruits. L'activité larvaire est obtenue à la fois par ingestion et par contact.

Les papillons adultes ne sont pas détruits.

Aussitôt que le produit a été ingéré, il apparaît très rapidement des symptômes de paralysie, de sorte que les larves arrêtent assez rapidement de manger et de bouger. Dans certains cas, la larve tombe directement de la feuille. Par l'action très rapide du produit, les dégâts sont réduits à un minimum. Après 1-2 jours, les larves sont mortes.

APPLICATIONS

En général

ALTACOR® doit être pulvérisé de façon homogène. Il faut bien régler le pulvérisateur afin d'éviter toutes dérives ainsi que tout surdosage.

Quantité d'eau

Pour une bonne répartition du produit, il est préférable d'utiliser assez d'eau afin de s'assurer que l'ensemble de la culture est entièrement recouverte.

Légumes-fruits - sous protection

tomate, aubergine et pépinos, poivron/piment, cornichon, courgette/pattison, concombre, melon et potiron.

Usage

ALTACOR® peut être utilisé pour lutter contre les chenilles défoliatrices (*Mamestra, Spodoptera, Autographa, Pieris…).*

Aussi, en tomate, aubergine et poivron le produit peut être utilisé pour le contrôle des mineuses de la tomate (*Tuta absoluta*).

Le moment de la première pulvérisation dépend du développement de l'attaque. Il est conseillé de débuter la lutte dès que les premieres symptômes sont visibles.

Exécuter d'éventuels traitements suivant avec un intervalle de 7 à 14 jours. Le produit peut être appliqués jusqu'à 2 fois de suite (bloc).

En culture hydroponique, 2 blocs de 2 applications chacun peuvent être menés, en respectant un interval minimum de 90 jours entre chaque bloc.

Entre les blocs, des produits avec mode d'action différent doivent être utilisés.

Doses

La dose par traitement est de 40 g/ha d'haie.

Cela correspond à environ 100 g/ha.

Cette dose de 100 gram/ha est basée sur une hauteur moyenne de la culture de 2 m. On peut adapter la dose en fonction de la culture avec le tableau ci-dessous :

Hauteur de la culture (m)	Dose (g/ha)
<1,50	**80**
1,50	80
2,00	**100**
2,50	125
3,00	150

NOIR

051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page5

Haricot vert - sous protection

Usage
ALTACOR® peut être utilisé pour lutter contre les chenilles défoliatrices (*Mamestra, Spodoptera, Autographa, Pieris*…). Il est conseillé de débuter la lutte dès que les premieres symptômes sont visibles.

Nombre d'application et intervalle d'application
Il est permis de faire au maximum 2 applications par saison avec un minimum intervalle de 7-14 jours. Dans le cas d'un developpement très rapide de la culture combiné à une forte pression, respecter l'intervalle entre applications le plus court possible.

Doses
La dose par traitement est de 40 g/ha d'haie (culture vertical), avec un minimum de 80 g/ha du sol ; ou 100 g/ha du sol (culture horizontal).

Légumes feuilles - sous protection

Mâche, laitues, endives, radicchio rosso, Pain de sucre, roquette, jeunes pousses (recoltées jusqu`au stade 8 vraies feuilles), épinard et bette

Usage
ALTACOR® peut être utilisé pour lutter contre les chenilles défoliatrices (*Mamestra, Spodoptera, Autographa, Pieris*…). Il est conseillé de débuter la lutte dès que les premieres symptômes sont visibles.

Nombre d'application et intervalle d'application
Il est permis de faire au maximum 2 applications par saison avec un minimum intervalle de 7-14 jours. Dans le cas d'un developpement très rapide de la culture combiné à une forte pression, respecter l'intervalle entre applications le plus court possible.

Doses
La dose par traitement est 100 g/ha.

FINE HERBES - sous protection

Aneth, céleri à couper, cerfeuil, angélique, carvi, coriandre, livèch, persil, ciboulette, estragon, mélisse, menthe, basilic, origan/marjolaine, sauge, officinale, thym, romarin, cerfeuil musqué, et lauries (consommation des feuilles et/ou tiges)

Usage
ALTACOR® peut être utilisé pour lutter contre les chenilles défoliatrices (*Mamestra, Spodoptera, Autographa, Pieris*…). Il est conseillé de débuter la lutte dès que les premieres symptômes sont visibles.

Nombre d'application et intervalle d'application
Il est permis de faire au maximum 2 applications par saison avec un minimum intervalle de 7-14 jours. Dans le cas d'un developpement très rapide de la culture combiné à une forte pression, respecter l'intervalle entre applications le plus court possible.

Doses
La dose par traitement est 100 g/ha.

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans cultures gérées selon les principes de la lutte intégrée. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE DE PULVÉRISATION

- Commencer avec un pulvérisateur propre;
- Remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Ajouter la quantité nécessaire de produit et mettre le système d'agitation en marche;
- Continuer à remplir la cuve avec de l'eau;
- Pendant la pulvérisation, laisser le système d'agitation en marche;
- Les emballages doivent être vidés correctement, rincés à l'eau, et l'eau de rinçage doit retourner dans la cuve de pulvérisation.

ATTENTION:
Fermer hermétiquement l'emballage conformément aux dispositions légales régionales.
Ne préparez pas plus de bouillie de pulvérisation que nécessaire.

MELANGES

Etant donné qu'il est impossible de tester toutes les combinaisons possibles, DuPont n'est pas tenu responsable pour les mélanges avec des produits qui ne sont pas cités pour un mélange éventuel avec ALTACOR®. Demandez conseil à votre revendeur.
Lire également l'étiquette du partenaire dans le mélange.

SURPLUS DE TRAITEMENT

Pour éviter ces surplus de pulvérisation la quantité nécessaire de produit à pulvériser sera calculée avec précision en fonction de la surface de la parcelle et du débit par hectare de la machine.

NOIR

051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page6

NETTOYAGE DU MATERIEL DE PULVERISATION

Il est très important et c'est une bonne pratique agricole de bien nettoyer l'appareil de pulvérisation directement après le traitement.

1. Remplir la cuve à moitié d'eau;
2. Mettre le système d'agitation en marche et laisser agir pendant une dizaine de minutes
3. Ensuite pulvériser le mélange sur la parcelle venant d'être traitée;
4. Nettoyer les filtres et jets soigneusement;
5. Finalement rincer complètement la machine (cuve, rampe, conduites et jets) avec de l'eau claire;

ATTENTION:

Eviter la pollution de toute eau de surface (étangs, fossés, ect…) et surtout celle qui est destinée à l'irrigation des cultures.

RESISTANCE

Lorsque des insecticides ayant le même mode d'action sont utilisés consécutivement pendant plusieurs années pour contrôler les mêmes espèces d'insectes dans les mêmes champs, alors des biotypes résistants, naturellement présents dans la population, peuvent survivre et devenir résistants dans cette parcelle. Un insecte est caractérisé comme étant résistant ou moins sensible lorsqu'il n'est pas détruit à la dose recommandée et au moment optimal de pulvérisation.

Certains insectes ont acquis une résistance à certains produits commerciaux.

Pour éviter que le phénomène ci-dessus se produise très rapidement, il est très important que l'utilisateur :

- dans la culture de l'année : mélanger ou alterner ALTACOR® avec des produits ou des mélanges de produits de famille différente, à mode d'action différent.
- suivez le développement de la population d'insectes, et utilisez le ALTACOR® si le seuil de nuisibilité atteint. Il faudra peut être plus d'une application afin de réprimer la population.
- lisez attentivement les instructions sur l'étiquette à propos du dosage, de l'intervalle de traitement et de la période optimale de pulvérisation.

La présence possible d'une résistance ne peut pas être prévue. Consultez votre conseiller pour les recommandations au sujet de la gestion de la résistance.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS

Symptômes

Bien que ce produit ne soit pas classé comme dangereux pour la santé, des symptômes d'intoxication peuvent survenir en cas d'utilisation anormale ou d'ingestion accidentellement.

Inhalation : Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Projection dans les yeux : Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Ingestion : Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Remarques pour le médecin

Prise en charge: traitement symptomatique.

Vu le peu de cas d'intoxication rapportés chez l'homme, **une observation en milieu hospitalier est conseillée**. Contacter le Centre Antipoisons pour plus d'informations.

Pour informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons 070/245.245.**

IMPORTANT

Le vendeur garantit que ce produit est conforme à la description chimique indiquée sur cette étiquette et qu'il est destiné aux applications reprises sur l'étiquette et seulement lorsqu'il est utilisé en accord avec les recommandations d'emploi dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne s'étend pas à l'usage de ce produit pour des applications non recommandées ou contraires aux indications d'emploi, ou dans des conditions anormales d'utilisation ou sous des conditions qui ne peuvent pas raisonnablement être prévues par le vendeur; l'acheteur assume tous les risques de tels usages. Le vendeur ne fournit aucune autre garantie, ni expresse, ni impliquée.

Fabriqué en France

® Marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

NOIR

051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page7

DUPONT®

Altacor®

INSECTICIDE

GROEP	28	INSECTICIDE

RYNAXYPYR® powered by

Insecticide voor de bestrijding van insecten in vruchtgroenten, bladgroenten, verse kruiden en stamslabonen onder bescherming.

Erkenningsnummer: 10300P/B

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 35% chlooraantraniliprole.

® Gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

Waarschuwing

GEVARENAANDUIDINGEN

• Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

• Buiten het bereik van kinderen houden.
• Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
• Voorkom lozing in het milieu.
• Gelekte/gemorste stof opruimen.
• Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

ANDERE VERMELDINGEN

• Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
• Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
• Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

OPSLAG

• In originele goed gesloten verpakking bewaren.

VERNIETIGEN VAN DE LEGE VERPAKKING

De verpakking volledig ledigen en met water spoelen door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen met schudden) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden en verspoten volgens de gebruiksaanwijzing.
De aldus gespoelde verpakking mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden, maar moet volgens de wettelijke regionale voorschriften afgevoerd worden (PhytofarRecover).

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page8

TOEGESTAAN GEBRUIK

Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecticide in de teelten onder bescherming van:

a. tomaten;
b. paprika/Spaanse peper;
c. aubergine/eierplant;
d. komkommer;
e. augurk;
f. courgette/patisson;
g. meloen;
h. pompoen;
i. stamslabonen (princesse-, snijbonen);
j. veldsla;
k. slasoorten;
l. andijvie, radicchio rosso en suikerbrood;
m. rucola;
n. babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren);
o. spinazie;
p. warmoes (snijbiet);
q. verse kruiden (consumptie bladeren en/of stengels).

Uiterste gebruikstijdstip voor de oogst
1 dag.

GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMEEN

Werking
ALTACOR® is een insecticide dat gebruikt dient te worden voor de bestrijding van bladvretende rupsen en/of de tomatenmineermot (*Tuta absoluta*). ALTACOR® heeft vooral een larvicide werking. Alle larvale stadia worden bestreden. De larvale werking wordt verkregen via zowel opname door vraat als opname door contact. Volwassen motten worden niet bestreden.
Zodra het middel is opgenomen ontstaan er binnen enkele uren verlammingsverschijnselen, die ervoor zorgen dat de rups vrijwel direct stopt met bewegen en vreten. In sommige gevallen zal de rups direct van het blad afvallen. Door de snelle werking wordt schade tot een minimum beperkt. Na 1-2 dagen zijn de rupsen gedood.

TOEPASSINGEN

Algemeen
ALTACOR® moet homogeen worden verdeeld. Het vereist een goed afgestelde spuitmachine om niet behandelde gedeelten en overdosering te vermijden.

Waterhoeveelheid
Voor een goede verdeling van het middel dient het middel in voldoende water te worden opgelost, zodanig dat het gehele gewas goed wordt bedekt.

VRUCHTGROENTEN onder bescherming
tomaat, aubergine/eierplant, paprika/Spaanse peper, augurk, courgette/pattison, komkommer, meloen en pompoen

Gebruik
ALTACOR® kan ingezet worden ter bestrijding van bladvretende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Pieris,*…)
Bovendien kan het middel in tomaat, aubergine en paprika ingezet worden ter bestrijding van tomatenmineermot (*Tuta absoluta*). Het tijdstip van de eerste bespuiting hangt af van de ontwikkeling van de plaag. Het wordt aanbevolen de bestrijding te starten zodra de eerste rupsen(schade) worden waargenomen.
Een eventuele volgende behandeling uitvoeren met een interval van 7-14 dagen. Het product mag in grondgebonden teelten maximaal 2 maal per jaar achter elkaar (blok) worden toegepast. In substraatteelten mogen twee blokken per jaar van twee toepassingen worden toegepast met een minimum interval van 90 dagen tussen de blokken. Tussentijds moeten producten met en ander werkingsmechanisme worden gebruikt.

Dosis
De dosis per behandeling is 40 g/ha haag.
Dit komt overeen met 100 g/ha.

Deze dosering van 100 gram/ha is gebaseerd op een gemiddelde gewashoogte van 2 m. De dosering kan naar boven of beneden worden aangepast conform onderstaande tabel.

Gewashoogte (m)	Dosering (g/ha)
<1,50	**80**
1,50	80
2,00	**100**
2,50	125
3,00	150

NOIR

051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page9

STAMSLABONEN (princesse-, snijbonen) ***onder bescherming***

Gebruik
ALTACOR® kan ingezet worden ter bestrijding van bladvretende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Pieris*…). Het wordt aanbevolen de bestrijding te starten zodra de eerste rupsen(schade) worden waargenomen.

Aantal toepassingen en toepassingsinterval
Het is toegestaan in totaal maximaal 2 toepassingen per jaar uit te voeren, met een interval van 7-14 dagen. Het kortste interval hanteren in geval van een zeer snelle ontwikkeling van het gewas in combinatie met een hoge infectiedruk.

Dosis
De dosis per behandeling is 40 g/ha haag (verticale teelt), met een minimum van 80 g/ha bodem; of 100 g/ha bodem (horizontale teelt).

BLADGROENTEN onder bescherming
Veldsla, slasoorten, andijvie, radicchio rosso en suikerbrood, rucola, babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren), spinazie en warmoes (snijbiet)

Gebruik
ALTACOR® kan ingezet worden ter bestrijding van bladvretende rupsen (*Mamestra, Spodoptera, Autographa, Pieris*…). Het wordt aanbevolen de bestrijding te starten zodra de eerste rupsen(schade) worden waargenomen.

Aantal toepassingen en toepassingsinterval
Het is toegestaan in totaal maximaal 2 toepassingen per jaar uit te voeren, met een interval van 7-10 dagen. Het kortste interval hanteren in geval van een zeer snelle ontwikkeling van het gewas in combinatie met een hoge infectiedruk.

Dosis
De dosis per behandeling is 100 g/ha.

VERSE KRUIDEN onder bescherming
Dille, snijselder, kervel, engelwortel, karwij, koriander, lavas, maggiplant, peterselie, bieslook, dragon, citroenmelisse, munt, basilicum, marjolein/oregano, salie, tijm, rozemarijn, roomse kervel en laurier (consumptie bladeren en/of stengels)

Gebruik
ALTACOR® kan ingezet worden ter bestrijding van bladvretende rupsen (*Mamestra, Spodoptera, Autographa, Pieris*…). Het wordt aanbevolen de bestrijding te starten zodra de eerste rupsen(schade) worden waargenomen.

Aantal toepassingen en toepassingsinterval
Het is toegestaan in totaal maximaal 2 toepassingen per jaar uit te voeren, met een interval van 7-10 dagen. Het kortste interval hanteren in geval van een zeer snelle ontwikkeling van het gewas in combinatie met een hoge infectiedruk.

Dosis
De dosis per behandeling is 100 g/ha.
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding wordt toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

GEREEDMAKEN VAN DE SPUITVLOEISTOF
- Begin met een schone spuitmachine;
- Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking;
- Vul de tank verder met water;
- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking;
- Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden toegevoegd aan de tank.

LET OP:
De verpakking hermetisch sluiten om het product in de beste condities te bewaren.
Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.

MENGINGEN
Omdat het niet mogelijk is om alle mogelijke tankmix combinaties te testen, aanvaard DuPont geen aansprakelijkheid voor tankmengingen welke niet bij naam genoemd worden als zijnde te mengen met ALTACOR®. Raadpleeg hiervoor uw adviseur.
Raadpleeg te allen tijde het etiket van de mengpartner.

051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page10

BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hektare.

SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Het is van groot belang en tevens goed agrarisch gebruik om de apparatuur direct na de behandeling zorgvuldig schoon te maken.

1. Vul de tank halfvol met water;
2. Het roersysteem in werking stellen en een aantal minuten laten werken;
3. Vervolgens dit mengsel verspuiten over het zojuist bespoten perceel;
5. Tenslotte de gehele machine (spuittank, spuitboom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen;

LET OP:
Vermijd verontreiniging van oppervlaktewater (meren, grachten, enz....) en zeker deze die voor irrigatie van culturen in aanmerking komen.

RESISTENTIE

Wanneer insecticiden met dezelfde werkingswijze herhaaldelijk toegepast worden, gedurende verschillende jaren, om dezelfde soorten insecten te bestrijden, in hetzelfde veld, kunnen bepaalde resistente biotypes, die van nature aanwezig zijn in een populatie, overleven en dominant worden in deze percelen. Een insect wordt als resistent of minder gevoelig aangemerkt als deze niet afdoende wordt bestreden bij de aanbevolen dosering entoepassingsmoment, onder normale weersomstandigheden. Sommige insecten hebben reeds een resistentie ontwikkeld tegen commercieel verkrijgbare producten.

Om te vermijden dat bovengenoemd fenomeen (versneld) optreedt, is het belangrijk dat de teler:

- in hetzelfde gewas, in hetzelfde teeltjaar de toepassing van ALTACOR® afwisselt of mengt met producten (of mengingen van producten) van een verschillende chemische groep, met een andere werkingswijze.
- de ontwikkeling van de insect populaties volgt en ALTACOR® toepast indien de economische schadedrempels worden behaald. Meer dan één toepassing kan noodzakelijk zijn om de populatie voldoende te onderdrukken.
- de gebruiksaanwijzing, zoals deze op het etiket staat vermeld, met betrekking tot de dosering, het spuitinterval en het optimale toepassingsmoment opvolgt.

De mogelijke aanwezigheid van resistentie kan niet worden voorspeld. Raadpleeg uw adviseur voor aanbevelingen op het gebied van resistentiemanagement.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Symptomen

Alhoewel het product niet ingedeeld is als gevaarlijk voor de gezondheid, kunnen er zich vergiftigingsverschijnselen voordoen bij abnormaal gebruik of bij accidentele inname.

Inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking

Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking

Inslikken: Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing van actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling.
Daar het tot op heden geen of zeer weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens wordt **een observatie in het ziekenhuis aangeraden**. Contacteer het Antigifcentrum voor meer informatie.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **Het Antigifcentrum 070/245.245.**

BELANGRIJK

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden

051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page11

worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.

Gefabriceerd in Frankrijk

® Gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

NOIR

051424 K-32699 (12 pages) 27/05/14 12:02 Page12